

## AKO PREDCHÁDZAŤ INFEKCIÍ MOČOVÝCH CIEST U STARŠÍCH ĽUDÍ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



Získajte informácie o:

- Hygiene rúk
- Bariérových ochranných prostriedkoch a iných druhoch vybavenia
- Anogenitálnej hygiene
- Výmene plienok
- Vyprázdňovanie močového mechúra
- Močovým katétrom

SPRÁVNY SPÔSOB  
ROBÍ ROZDIEL

Máte „hviezdu“ kvalitu hygieny? Zistite, či sa počet hviezdičiek  
vašej kvality hygieny zvýši po prečítaní tohto letáku.

Starší ľudia v zariadeniach sociálnych služieb sú vystavení závažnému riziku vzniku infekcií močových cest. Prijatím niekoľkých jednoduchých opatrení môžete zlepšiť kvalitu hygiény a pomôcť predchádzať infekciám močových cest. Tento leták Vám môže pomôcť zachovať alebo zlepšiť základné postupy, ktoré preukázateľne znížujú riziko infekcií močových cest u starších ľudí v zariadeniach sociálnych služieb.

## **Na titulných stranách nájdete témy s krátkym vysvetlením. Na zadných stranach sú texty, ktoré tieto odporúčania podporujú.**

1. Mody L, Krein SL, Saint S, Min LC, Montoya A, Lansing B, et al. A targeted infection prevention intervention in nursing home residents with indwelling devices. National Institutes of Health; 2015.
2. Meddings J, Saint S, Krein SL, Gaiés E, Reichert H, Hickner A, et al. Systematic review of interventions to reduce urinary tract infection in nursing home residents. National Institutes of Health; 2017.
3. Omli R, Skotheim LH, Myklebust A, Bakke A, Kuhry E, Midthjell K. Pad per day usage, urinary incontinence, and urinary tract infections in nursing home residents. National Institutes of Health; 2010.
4. Raz R, Stamm WE. Recurrent urinary tract infections in postmenopausal women. National Institutes of Health; 2000.
5. Chenoweth CE, Gould CV, Saint S. Diagnosis, management, and prevention of catheter-associated urinary tract infections. National Institutes of Health; 2013.
6. World Health Organization. Infection prevention and control. Geneva: World Health Organization; 2020.



Co-funded by  
the European Union

Co-funded by the European Union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union and/or the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



## HYGIENA RÚK

CHRÁŇTE OBYVATEĽA PRED  
INFEKCIOU MOČOVÝCH  
CIEST VYKONANÍM:

- DEZINFKECIE RÚK
- UMÝVANIA RÚK



IMA  
INE



Otočte stranu a získajte ďalšie informácie

# PRENOS BAKTÉRIÍ Z RÚK DO MOČOVÝCH CIEST MÔŽE SPÔSOBIŤ INFEKCIU MOČOVÝCH CIEST

## DOBRÁ KVALITA HYGIENY RÚK VYŽADUJE DOBRE PODMIENKY:

Predpokladom optimálnej hygieny rúk sú neporušená pokožka, rukávy nad lakťom, čisté krátke nechty bez laku, prsty bez šperkov a predlaktia bez náramkových hodiniek alebo šperkov.

## SPRÁVNA VOLBA:

Na čistých a suchých rukách je pravou voľbou dezinfekcia rúk.

Pri viditeľne znečistených alebo mokrých rukách a po pomocí obyvateľovi pri návštive toalety sa odporúča umyť si ruky a následne ich vdezinifikovať.

## SPRÁVNY OKAMIH:

Hygiena rúk sa musí vykonať:

- Pred a po všetkých úkonoch súvisiacich s anogenitálnou hygienou, výmenou plienok a manipuláciou s permanentným močovým katétrom.
- Po použití jednorazových rukavíc.



## BARIÉROVÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY A OSTATNÉ VYBAVENIE

CHRÁŇTE OBYVATEĽA PRED INFEKCIOU  
MOČOVÝCH CIEST POUŽÍVANÍM:



Jednorazových rukavíc  
Jednorazovej zástery

ČISTÉHO VYBAVENIA AKO SÚ:

- UMÝVACIE UTIERKY/ŽINKY
- UTERÁKY
- UMÝVADLO
- NÁDOBA NA VYPRÁZDŇOVANIE MOČOVÉHO VAKU PRI PERMANENTNOM MOČOVOM KATÉTRI

IMA INE

Otočte stranu a získajte ďalšie informácie 

# **PRENOS BAKTÉRÍ Z PRACOVNÉHO ODEVU A VYBAVENIA DO MOČOVÝCH CIEST MÔŽE SPÔSOBIŤ INFEKCIU MOČOVÝCH CIEST.**

Bariérové ochranné prostriedky a ostatné vybavenie musia byť čisté a nesmú sa používať opakovane na iné úlohy alebo pre iných obyvateľov, aby sa zabránilo prenosu mikroorganizmov.

Aby bol pracovný postup bezpečný, musia sa všetky bariérové ochranné prostriedky a ostatné vybavenie umiestniť na čistú pracovnú plochu pred úkonmi ako sú výmena plienok, vykonávania anogenitálnej hygiény a manipulácia s permanentným močovým katétrom.



**Jednorazové rukavice sa musia meniť pri prechode z nečistej úlohy na čistú úlohu.**

**Jednorazové rukavice a jednorazové zástery sa musia po každom jednotlivom použíti zlikvidovať.**

**IMA** **CINE**

# ANOGENITÁLNA HYGIENA

NEZABUDNITE NA VAŠU HYGIENU RÚK BEZPROSTREDNE PRED A PO VYKONANÍ ANOGENITÁLNEJ HYGIENY.



ANOGÉNITÁLNU HYGIENU VÝKONAJTE  
DENNE A PRI KAŽDEJ VÝMENE PLIENKY.



Žena

Výkonajte anogenitálnu hygienu smerom od otvoru močovej trubice - zvnútra von.



Muž

Opatrne stiahnite predkožku.  
Umyte žalud' penisu v smere od otvoru močovej trubice - zvnútra von.

Opatrne stiahnite predkožku späť na miesto.

Permanenlý močový katéter

Umyte močovú hadičku v smere od otvoru močovej trubice - zvnútra von.

IMA CINE


Otočte stranu a získajte ďalšie informácie



Je dôležité umývať otvor/vyústenie močovej rúry v smere od otvoru močovej rúry - zvnútra von.

Otvor močovej rúry je vstupnou bránou pre baktérie, ktoré sa ľahko prenášajú močovými cestami a môžu viesť k infekcii močových ciest.

Dôležité je tiež vykonávať anogenitálnu hygienu denné a pri každej výmene plienky, pretože mokrá a/alebo výkalmi znečistená plienka poskytuje vhodné prostredie pre množenie baktérií.



## VÝMENA PLIENKY



NEZABUDNITE NA HYGIENU RÚK BEZPROSTREDNE PRED A PO VYKONANÍ ANOGENITÁLNEJ HYGIENY.

PLIENKU VYMIEŇAJTE MINIMÁLNE 3-KRÁT DENNE. SNAŽTE SA VYMENIŤ PLIENKU MOČENÍM ČO NAJSKÔR PO ŅOM.

POSTUPNE ZISTÍTE PRIBLIŽNÉ ČASY POČAS DŇA, KEDY ŠA PLIENKA STANE MOKROU, ABY STE MOHLI POMÔCŤ PRI NÁVŠTEVE TOALETY AKO ALTERNATÍVY K POUŽÍVANIU PLIENOK NA MOČENIE - AK JE TO MOŽNÉ.



- UDRŽUJTE ANOGENITÁLNU OBLAŠŤ ČISTÚ.
- VYBERTE SPRÁVNU VEĽKOSŤ PLIENKY.


IMA INE

Otočte stranu a získajte ďalšie informácie

Mnohí starší obyvateľia domovov dôchodcov trpia inkontinenčiou moču a používajú plienky.

Baktéria prenesené z mokrej alebo výkalmi kontaminovanej podložky na kožu sa môže ďalej preniesť do močových ciest a spôsobiť infekciu močových ciest.

Veľkosť plienky je zvolená správne vtýdy, keď plienka dokáže absorbovať očakávané množstvo moču do jej nasledujúcej výmeny.




IMAGINE

## VYPRÁZDŇOVANIE MOČOVÉHO MECHÚRA

NEZABUDNITE NA HYGIENU SVOJICH RÚK BEZPROSTREDNE PRED A PO ASISTENCIÍ PRI NÁVŠTEVE TOALETY.

SNAŽTE SA, ABY OBYVATEĽ NAVŠTÍVIL TOALETU MINIMÁLNE 3-KRÁT DENNE (AK JE TO MOŽNÉ VZHĽADOM NA JEHO FYZICKÝ A PSYCHICKÝ STAV).



- Pomáhajte pri vyprázdňovaní močového mechúra zabezpečením dosťatočného času a dobrej polohy v sedе.
- Ak je to možné, zvážte možnosť techniky trojitého vymočenia.
- Zvážte potrebu USG vyšetrenia močového mechúra (zobrazenie množstva reziduálneho moču) – ak je to možné.

IMA CINE

Otočte stranu a získajte ďalšie informácie 

Objem reziduálneho moču po vymočení môže súvisieť napr. s vysokým vekom, inkontinenčiou, zniženou pohyblivosťou ožápchou (obstipáciou). Reziduálny moč, ktorý ostane v močovom mechúre, je vhodným prostredím pre množenie baktérií.

Poučenie o potrebe vytvorenia dostatočného časového priestoru a pomoc osobám, aby sa pri vyprázdnovaní močového mechúra cítili bezpečne, môžu zabrániť zadrižiavaniu reziduálneho moču.

Trojité vymočenie znamená, že sa pokus vyprázdiť močový mechúr trikrát za sebou opakuje, namiesto jedného vymočenia. To môže prispieť k tomu, že močový mechúr bude lepšie vyprázdný.



# ZAVEDENIE A STAROSTLIVOSŤ O MOČOVÝ KATÉTER



**HYGIENU RÚK VYKONAJTE BEZPROSTREDNE PRED A PO  
ZAVEDENÍ MOČOVÉHO KATÉTRA A BEZPROSTREDNE  
PRED A PO MANIPULÁCII S MOČOVÝM KATÉTROM.**

- Zaviesť močový katéter môže iba vyškolený zdravotnícky pracovník.
- Pri zavádzaní katétra zaistite aseptickú techniku.
- Posudzujte denne u klienta prítomnosť bolesti alebo dyskomfortu.
- Čistite ústie močovej rúry a kontrolujte, či jeho okolie nie je začervené alebo podráždené.
- Skontrolujte, či katéter v mieste vstupu neobsahuje inkrustovaný materiál a či adekvátnie zabezpečuje drenáž moču.
- Katéter, ktorý už nie je potrebný, je nutné odstrániť.

**IMA CINE**

Otočte stranu a získejte ďalšie informácie



Pri zavádzaní močového katétra je dôležité dodržať aseptickú techniku. U vykonajte anogenitálnu h.y gienu. Zahodťte rukavice a vykonajte hygienu. RúkvedP vezadením katétra vytvorte sterilné pole použitím sterilných rukavíc, špongie a sterilného katétra.

Nedotýkajte sa predmetov v sterilnom poli nesterilnými rukami alebo nesterilnými predmetmi.

Zabezpečte, aby ste nekontaminovali katéter a aby sa jeho špička nedotkla kože pred jeho zavedením do močovej rúry. Ak sa katéter náhodou kontaminuje, vyhodťte ho a použiťe nový, sterilný.


Aj pri dodržaní adékvátnej hygiény zavedený močový katéter zvyšuje riziko infekcie močových ciest. Preto sa močové katétre majú používať iba ak sú medicínsky nevyhnutné a majú sa odstrániť, keď už nie sú potrebné.



IMAGINE

## **MANIPULÁCIA S MOČOVÝM VAKOM PERMANENTNÉHO MOČOVÉHO KATÉTRA**

**NEZABUDNITE NA HYGIENU SVOJICH RÚK BEZPROSTREDNE  
PRED A PO VYPRÁZDENÍ MOČOVÉHO VAKU.**



- Umiestnite močový vak vo výške pod úrovňou močového měchúra alebo nanajvýš v jeho úrovni.
- Zabráňte kontaminácii močového vaku od podlahy.
- Správne zafixujte hadičku močového vaku tak, aby ste zabránili jej prekrúteniu, ťahaniu a tlaku na močový vak a samotnú hadičku.
- Pri výmene močového vaku použite vždy nový, dosiaľ nepoužitý močový vak

**IMA  
C  
INE**




**Otočte stranu a získajte ďalšie informácie**

Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri odtoku z močového vaku nevytváral spätný tok. Tomu sa dá predísť, ak je močový vak umiestnený vo výške pod úrovňou močového mechúra alebo nanajvýš na jeho úrovni.

Jednoduché pravidlo požaduje, že močový vak sa nesmie dotýkať podlahy, pretože baktérie z podlahy sa môžu preniesť cez močový vak do močových ciest.

Hadička močového vaku musí byť správne upevnená, aby sa predíšlo jej prekrúteniu, ťahaniu a tlaku, pretože to môže spôsobiť vznik malých poškodení sliznice v močových cestách, čo zvyšuje riziko infekcie.

Pri výmene močového vaku sa miesto jeho spojenia s katétrom ľahko kontaminuje, čo môže spôsobiť infekciu močových ciest. Tomu sa dá predísť tým, že pri výmene sa vždy použije nový, dosiaľ nepoužitý močový vak.



## VYPRÁZDŇOVANIE MOČOVÉHO VAKU PERMANENTNÉHO MOČOVÉHO KATÉTRA

NEZABUDNITE NA HYGIENU SVOJICH RÚK BEZPROSTREDNE  
PRED A PO VYPRÁZDNENÍ MOČOVÉHO VAKU.

NEZABUDNITE SI NAVLIECŤ ČISTÉ JEDNORAZOVÉ RUKAVICE A  
ČISTÚ JEDNORAZOVÚ ZÁSTERU.

- Vyprázdnite močový vak, keď je naplnený maximálne do  $\frac{3}{4}$ .
- Použite čistú nádobu.
- Po vyprázdnení močového vaku utrite výtokové miesto čistou papierovou alebo podobnou utierkou.



IMA  
INE

Otočte stranu a získajte ďalšie informácie 



Dbajte na vyprázdňovanie močového vaku, už keď je naplnený maximálne do  $\frac{3}{4}$ , aby ste zabránili stagnácii moču v hadičke a spätnému toku moču.

Používanie čistej nádoby, ako je napríklad nádoba na moč alebo vedro, zabraňuje kontaminácii špičky katétra.

Kvapky moču obsahujú baktérie.

Ich odstránenie prispieva k znížovaniu rizika prenosu baktérií.