


ITU en residents SENSE sonda permanent



*Si es poden excloure altres motius que poden explicar aquests signes i símptomes, especialment retenció urinària, deshidratació, efectes secundaris de medicaments, altres focus infecciosos o altres malalties.

ITU en residents AMB sonda permanent*

Nou inici o empitjorament de ≥ 1 criteri (no sembla probable cap altra explicació**).

- Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- Calfreds
- Dolor de flanc o percussió renal dolorosa
- Clar empitjorament mental de l'estat funcional

SÍ ↓

**Alta probabilitat d'ITU.
Contacteu amb el metge.**

*Els residents amb una sonda intermitent o una sonda-preservatiu han de seravaluats com si no estiguessin sondats.

**Si es poden excloure altres motius que poden explicar els signes i símptomes, especialment retenció urinària, deshidratació, efectes secundaris de medicaments, altres focus infecciosos o altres malalties.

Signes i símptomes del tracte urinari inferior	Empitjorament de l'estat mental o funcional
Disúria	Confusió aguda
Freqüència	Canvi de comportament sobtat (deliri, agitació, apatia)
Urgència	Malestar general agut
Incontinència	Pèrdua de gana (també vòmits, nàusees)
Dolor suprapubic o dolor abdominal baix	Reducció de la ingestió de líquids
Dolor, inflor o palpació dolorosa de testicles, epididim o próstata	

Si us plau, recordeu:

- ! • NO confieu en les tires reactives d'orina si se sospiتا que un resident pot presentar una ITU.
- Les característiques de l'orina, com un color més fosc, una hematúria apparent i/o pudor, NO són signes d'infecció urinària.