



IMAGINE


Kritériá pre infekcie močových ciest u starších ľudí



Co-funded by the European Union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



UTI u obyvateľov BEZ zavedeného katétra



*Ak je možné vylúčiť iné príčiny príslušných príznakov a symptómov, najmä retenciu moču, dehydratáciu, vedľajšie účinky liekov, iné infekčné ložiská alebo iné ochorenia.

Infekcia močových ciest u obyvateľov so zavedeným katétrom*

Nový výskyt alebo zhoršenie ≥ 1 kritéria (a žiadne iné vysvetlenie sa nezdá byť pravdepodobné**)

- Teplota ≥ 38 °C
- Trasúce sa zimnice
- Bolesť boku alebo citlivosť obličkového uhla
- Jednoznačné zhoršenie mentálneho funkčného stavu

ÁNO ↓

Vysoká pravdepodobnosť výskytu UTI.
Kontaktný lekár.

**Obyvatelia s intermitentným katétrom alebo kondómovým katétrom by mali byť hodnotení, ako keby neboli katetrizovaní.*

***Ak je možné vylúčiť iné príčiny príslušných príznakov, najmä retenciu moču, dehydratáciu, vedľajšie účinky liekov, iné infekčné ložiská alebo iné ochorenia.*

Príznaky a symptómy dolných močových ciest	Zhoršený duševný alebo funkčný stav
Dyzúria	Akútna zmätenosť
Frekvencia	Akútne zmenené správanie (delírium, agitovanosť, apatia)
Naliehavosť	Akútna celková malátnosť
Inkontinencia	Strata chuti do jedla (tiež vracanie, nevoľnosť)
Suprapubická bolesť alebo bolesť v spodnej časti brucha	Znížený príjem tekutín
Bolesť, opuch alebo citlivosť semenníkov, nadsemenníkov alebo prostaty	

Nezabudnite, prosím:

- Pri určovaní podozrenia na infekciu močových ciest sa NESPOLIEHAJTE na meracie prístroje.
- Charakteristické znaky moču, ako je tmavšia farba, hrubá hematúria a/alebo nepríjemný zápach, NIE sú príznakmi infekcie močových ciest.