




Co-funded by the European Union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



UVI hos ældre UDEN urinvejskateter



*Andre forklaringer kan f.eks. være urinretention, dehydrering, bivirkninger af medicin, andre infektioner end UVI eller andre sygdomme.

UVI hos ældre MED urinvejskateter*

Mindst ét af nedensående symptomer (nyopstøet eller forværrer), og ingen anden sandsynlig forklaring**:

- Temperatur $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
- Kulderystelser.
- Flankesmerter eller flankeløshed.
- Tydelig forværring af mental eller funktionel status.

JA ↓

Stor sandsynlighed for UVI.
Kontakt læge.

*Ældre med et intermitterende urinvejskateter eller et kondomkateter skal vurderes, som om de ikke er kateteriserede.

**Andre forklaringer kan f.eks. være urinretention, dehydrering, bivirkninger af medicin, andre infektioner end UVI eller andre sygdomme.

Symptomer fra nedre urinveje	Forværret mental eller funktionel status
Smerter ved vandladning	Forvirring
Stærk vandladningsstrang	Ændret adfærd (delirium, agitation, apati)
Hyppig vandladning	Generel utilpashed
Urininkontinens	Nedsat appetit, opkastning eller kvalme
Smerter i nedre del af abdomen eller bækken	Reduceret væskeindtag
Smerter, hævelse eller ømhed i testiklerne, blyestikkerne eller prostata	

Husk:

- Urinstix er upålidelige hos ældre mennesker og kan derfor ikke bruges til at afgøre, om den ældre har UVI eller ej.
- Ændret farve eller lugt af urinen er IKKE tegn på UVI.