



IMAGINE


Merila za okužbe sečil pri starejših ljudeh



Co-funded by the European Union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Okužbe sečil pri prebivalcih BREZ vstavljenega katetra



*Če je mogoče izključiti druge vzroke za prisotne znake in simptome, zlasti retenco urina, dehidracijo, neželene učinke zdravil, druga infekcijska žarišča ali druge bolezni.

Okužbe sečil pri stanovalcih Z vstavljenim urinskim katetrom*

Nov pojav ali poslabšanje ≥ 1 merila (in nobena druga razloga ni verjetna**)

- Temperatura ≥ 38 °C.
- Mrzlica.
- Bolečina v ledvenem predelu ali občutljiv ledveni poklep.
- Jasno poslabšanje duševnega in funkcionalnega stanja.

DA ↓

Velika verjetnost za infekt sečil. Kontaktiraj zdravnika.

**Prebivalce z občasnim katetrom ali z urinarnim kondomom je treba obravnavati, kot da niso katetrizirani.*

***Če je mogoče izključiti druge razloge za prisotne znake in simptome, zlasti retenco urina, dehidracijo, neželene učinke zdravlil, druga infekcijska žarišča ali druge bolezni.*

Znaki in simptomi spodnjih sečil	Poslabšano duševno ali funkcionalno stanje
Disurija	Nenadna zmedenost
Frekvenca	Nenadno spremenjeno vedenje (delirij, agitacija, apatija)
Nujnost	Nenadno splošno slabo počutje
Inkontinenca	Izguba apetita (tudi bruhanje, slabost)
Suprapubična bolečina ali bolečina v spodnjem delu trebuha	Zmanjšan vnos tekočine
Bolečina, oteklina ali občutljivost testisov, obrmodka ali prostate	

Ne pozabite:

- Če pri stanovalcu sumite na okužbo sečil, se NE zanašajte na testne lističe.
- Značilnosti urina, kot so temnejša barva, makrohematurija in/ali neprijeten vonj, NISO znaki okužbe sečil.