

IMAGINE

Criterios para las infecciones del tracto urinario en personas mayores




Co-funded by
the European Union

Co-funded by the european union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the european union or the european health and digital executive agency (hadea). Neither the european union nor the granting authority can be held responsible for them.



ITU en residentes SIN catéter permanente



**Si pueden excluirse otras razones para los signos y síntomas respectivos, en particular retención urinaria, deshidratación, efectos secundarios de la medicación, otros focos infecciosos u otras enfermedades*

ITU en residentes CON catéter permanente*

Nueva aparición o empeoramiento de ≥ 1 criterio (y ninguna otra explicación parece probable**).

- Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
- Escalofríos.
- Dolor en el flanco o puñopercusión renal positiva.
- Empeoramiento claro del estado mental o funcional.

SI



Alta probabilidad de ITU.
Contactar con el médico.

**Los residentes con un catéter intermitente o un catéter condón deben ser evaluados como si no estuvieran cateterizados.*

***Si se pueden excluir otras razones para los signos y síntomas respectivos, en particular retención urinaria, deshidratación, efectos secundarios de la medicación, otros focos infecciosos u otras enfermedades.*

Signos y síntomas del tracto urinario inferior

Disuria

Frecuencia

Urgencia

Incontinencia

Dolor suprapúbico o dolor abdominal bajo

Dolor, hinchazón o sensibilidad en los testículos, el epidídimo o la próstata

Empeoramiento del estado mental o funcional

Confusión aguda

Cambio agudo de comportamiento (delirio, agitación, apatía)

Malestar general agudo

Pérdida de apetito (también vómitos, náuseas)

Reducción de la ingesta de líquidos

Por favor, recuerde:

- 
- No confíe en las tiras reactivas para determinar una sospecha de ITU en un residente.
 - Las características de la orina, como un color más oscuro, hematuria macroscópica y/o mal olor NO son signos de una ITU.