



Críteris per a les infeccions urinàries en persones grans



Co-funded by
the European Union

Co-funded by the european union, eu4health programme, project id 101079838. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the european union or the european health and digital executive agency (hadea). Neither the european union nor the granting authority can be held responsible for them.



ITU en residents SENSE sonda permanent

Nova aparició o empitjorament de ≥ 2 signes del tracte urinari inferior i símptomes i no sembla probable cap altra explicació*

SÍ

NO

Nova aparició o empitjorament d'1 signe i símptoma del tracte urinari inferior

○

Dolor al flanc o percussió renal dolorosa de nova aparició

&

Temp. $\geq 38^{\circ}\text{C}$ i/o calfreds

○

≥ 1 empitjorament dels criteris d'estat mental o funcional

Alta probabilitat d'ITU.

Contacteu amb el metge.

SÍ

· i no sembla probable cap altra explicació* ·

**Si es poden excloure altres motius que poden explicar aquests signes i símptomes, especialment retenció urinària, deshidratació, efectes secundaris de medicaments, altres focus infecciosos o altres malalties.*

ITU en residents AMB sonda permanent*

Nou inici o empitjorament de ≥ 1 criteri (i no sembla probable cap altra explicació**).

- Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- Calfreds
- Dolor de flanc o percussió renal dolorosa
- Clar empitjorament mental de l'estat funcional

SÍ



Alta probabilitat d'ITU.
Contacteu amb el metge.

**Els residents amb una sonda intermitent o una sonda-preservatiu han de ser avaluats com si no estiguessin sondats.*

***Si es poden excloure altres motius que poden explicar els signes i símptomes, especialment retenció urinària, deshidratació, efectes secundaris de medicaments, altres focus infecciosos o altres malalties.*

Signes i símptomes del tracte urinari inferior

Disúria

Freqüència

Urgència

Incontinència

Dolor suprapúbic o dolor abdominal baix

Dolor, inflor o palpació dolorosa de testicles, epidídim o pròstata

Empitjorament de l'estat mental o funcional

Confusió aguda

Canvi de comportament sobtat (deliri, agitació, apatia)

Malestar general agut

Pèrdua de gana (també vòmits, nàusees)

Reducció de la ingesta de líquids

Si us plau, recordeu:

- NO confieu en les tires reactives d'orina si se sospita que un resident pot presentar una ITU.
- Les característiques de l'orina, com un color més fosc, una hematúria aparent i/o pudor, NO són signes d'infecció urinària.